

**15:00 hrs.**

2 Mifepristonas

**18:00 hrs.**

2 Mifepristonas

**20:00 hrs.**

2 Mifepristonas

**21:00 hrs.**

4 Misotrol Sublingual (1 comprimido c/5 minutos). Las Pastillas se derriten en la boca y luego se tragan.

**01:00 hrs.**

4 Misotrol Sublingual (1 comprimido c/5 minutos). Las Pastillas se derriten en la boca y luego se tragan.

**01:00 - 03:00 hrs.**

Dolor abdominal, sensación de quemazón en el bajo vientre, escalofríos (otras complicaciones: Diarrea, Cefalea, Diaforesis, Fiebre, Palpitaciones, Vómitos).

**03:00 hrs.**

Opcional 1 tramadol.

**05:00 hrs.**

4 Misotrol Sublingual (1 comprimido cada 5 minutos). Las pastillas se derriten en en la boca y luego se tragan.

**06:00 hrs.**

Opcional: 1 tramadol.

**07:00 - 09:00 hrs.**

Aumenta el Dolor y comienza la Hemorragía.

**10:00 hrs.**

Opcional:1 tramadol.

**14:00 hrs.**

1 Cefadroxilo.

**14:00 hrs.**

1 Cefadroxilo (día siguiente).

Realizar ecografía 5 días después de finalizado el sangrado.